

Гусаревич О.Г., Малышев В.Е.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ ГЛАУКОМой В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ И г. НОВОСИБИРСКЕ В 2003 г.

Изучена распространенность глаукомы в Новосибирском регионе. Наиболее часто встречается первичная открытоугольная глаукома у женщин старше 60 лет. Уровень распространенности глаукомы среди областного населения выше в сравнении с городскими жителями. Разработаны методы борьбы с глаукомой.

Несмотря на довольно многочисленные исследования, посвященные глаукоме, следует признать, что в большинстве они посвящены вопросам патогенеза, клиники и различным методам лечения. Социально-гигиенические аспекты этого заболевания, вопросы инвалидности вследствие глаукомы изучены в меньшей степени.

Вместе с тем изучение распространенности глаукомы как одной из причин, наиболее часто приводящих к слабозрению и слепоте, необходимо для комплексной оценки данного заболевания и последующей разработки методов борьбы с ней.

По данным отечественной литературы, пораженность населения глаукомой в России и бывших республиках СССР среди всех глазных заболеваний колебалась в пределах 0,8-1,5% и имела довольно значительный диапазон по некоторым географическим регионам или территориальным субъектам.

В современной России по последним данным насчитывалось порядка 700 000 больных глаукомой.

Относительно Новосибирского региона следует отметить, что общее количество диспансерных глаукомных пациентов по г. Новосибирску и по Новосибирской области приблизительно одинаковое.

Так, на конец 2003 г. на диспансерном учете по поводу глаукомы в г. Новосибирске состояло – 6083, а по Новосибирской области – 6244 человека. Соответственно уровень распространенности глаукомы по г. Новосибирску составил – 54,47, а по области – 61,71 человек на 10 000 взрослого населения.

В 2003 г. по г. Новосибирску было впервые выявлено 798 случаев этого заболевания и 477 по области. Из них наиболее часто регистрировалась первичная форма заболевания: по

г. Новосибирску – 764 человека, а по НСО – 434 случая.

Различные формы вторичной глаукомы из впервые выявленных случаев заболевания составили – 4,42% от их общего количества (34 случая) по г. Новосибирску, а по НСО – 8,95% (41 человек).

Что касается уровня первичной слепоты от глаукомы, то между городом и областью имеется определенное расхождение. Так, по г. Новосибирску в 2003 г. впервые было выявлено 46 случаев слепых на 1 глаз, а по области – 95 случаев.

Впервые выявленной слепоты на оба глаза по городу было зафиксировано 3, а по НСО – 10 случаев.

Таким образом, выявляемость глаукомы по г. Новосибирску в 2003 г. составила – 0,92, а по НСО – 0,39 на 100 осмотренных жителей региона. В то время как заболеваемость глаукомой среди городского населения областного центра составила – 0,057, а среди областного населения – 0,047 на 100 жителей.

Сравнительный анализ (в процентном отношении) диспансерных пациентов с первичной глаукомой, которые наблюдаются по Новосибирскому региону, представлен в таблице 1.

Таблица 1. Форма первичной глаукомы в Новосибирской области и Новосибирске

Форма первичной глаукомы	Новосибирская область	Новосибирск
Открытоугольная	95,37%	95,27%
Закрытоугольная	4,17%	4,31%
Смешанная	0,46%	0,42%

Следовательно, подавляющей разновидностью первичной глаукомы по Новосибирскому региону является открытоугольная форма.

В целом по Новосибирской области наблюдается значительное количество пациентов с различными формами вторичной глаукомы – 297 человек (4,76% от общего количества пациентов), в то время как в областном центре – 164 человека (2,71%), что определяется, главным образом, за счет пациентов с фактогенными формами в сельских районах.

В обоих территориальных субъектах среди диспансерных пациентов в половом аспекте преобладают женщины: по городу – 3772 (63,65%), по области – 3421 человек (54,47%). Мужчины составили – 2211 (36,35%) и 2843 человека (45,53%), соответственно.

Однако данный показатель не отражает реальности относительно распространенности